

Positivlisten omfatter lægemidler, der på regionens regning kan rekviseres af læger **til brug i almen praksis** i Region Sjælland ved akutbehandling (jf. Overenskomsten om almen praksis §36). Listen er gældende fra den 9. februar 2024.

Ifølge den gældende receptbekendtgørelse skal lægemidler til brug i praksis rekviseres elektronisk via FMK. **Apotekerne skal fakturere al rekvisition (inkl. gebyrer) ved anvendelse af regel 11. Faktura må ikke anvendes.**

Apoteket må kun ekspedere lægemidler inden for den angivne ATC-kode på listen og skal substituere til de billigste synonyme eller parallelimporterede præparater, hvorfor "Ej S" ikke er mulig. I særlige tilfælde kan praktiske forhold tages i betragtning såsom hensyn til blisterpakning, delekær og udløb. **Vær opmærksom på begrænsninger i mulighederne for rekvisition inden for styrke og lægemiddelformulering samt typen af inhalationsdevice.**

Rekvisitionerne skal tilrettelægges således, at der ikke opbygges større lagre hos de praktiserende læger. Der bør som udgangspunkt kun rekviseres lægemidler **til højst 3 måneders forbrug**. Mængden af lægemidler, der udleveres til patienter, bør kun svare til patientens behov, indtil lægemidlet kan fremskaffes fra et apotek.

Ved restordre på angivne lægemidler **skal apotekerne kontakte regionen** med henblik på godkendelse af en rekvisition på et alternativt præparat, medmindre alternativet allerede fremgår af listen. Regionen vil løbende bestræbe sig på at tilføje en bemærkning om et godkendt alternativt præparat, der må rekviseres i tilfælde af restordre.

Listen er udarbejdet i samarbejde mellem PLO-Sjælland, Den Regionale Lægemiddelkomité, praksiskonsulent under regional lægevagt, konstitueret chef for Kvalitet og Lægemidler, Lægevagtschef for regional lægevagt og Lægemiddelenheden.

Spørgsmål og ændringsforslag til Positivlisten kan rettes til:

Lægemiddelenheden, Region Sjælland på mail lmenheden@regionsjaelland.dk.

MIDLER MOD INFektIONER – PENICILLINER:

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
J01CE01	Benzylpenicillin	pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning [#]	0,6 g (1 mill. IE) 1,2 g (2 mill. IE) 3 g (5 mill. IE)	
J01CE02	Phenoxyethylpenicillin	tablet	400 mg (600.000 IE) 800 mg (1,2 mill. IE)	Fx Primcillin <i>Primcillin 400 mg kan deles mhp. på en halv dosis, fx til børn</i>
J01CE02	Phenoxyethylpenicillin	tablet	990 mg (1,5 mill. IE)	<i>Til erythema migrans (Borrelia burgdorferi)</i>

Intramuskulær (i.m.) indgift bør kun anvendes, hvis benzylpenicillin ikke kan gives intravenøst (i.v.), idet stoffet er stærkt lokalirriterende. Der bør anvendes opløsning tilsat lokalanalgetikum (lidokain) ved opblanding til i.m. indgift. Denne lidokainchlorid-opløsning må kun anvendes i.m. og ikke gives i.v., jf. instruktion på www.pro.medicin.dk.

MIDLER MOD INFektIONER – MAKROLIDER:

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
J01FA09	Clarithromycin	tablet	500 mg	OBS. Ikke depottabletter
	Clarithromycin	granulat til oral suspension	25 mg/ml	<i>Ved restordre kan 50 mg/ml rekviseres</i>
J01FA06	Roxithromycin ^a	tablet	150 mg	<i>OBS. Ved restordre kan 300 mg rekviseres.</i>

^a Roxithromycin er 1. valg ved penicillin allergi for de fleste indikationer. Der savnes erfaring med Roxithromycin til børn under 40 kg.

MIDLER MOD URINVEJSINFektIONER:

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
J01CA08	Pivmecillinam	tablet	200 mg	
			400 mg	
J01XE01	Nitrofurantoin	tablet	50 mg	
J01EA01	Trimethoprim	tablet	100 mg	

MIDLER MOD INFETIONER - PENICILLINER MED UDVIDET SPEKTRUM:

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
J01CA04	Amoxicillin	tablet	750 mg	Til KOL-eksacerbationer (bakterielt betinget)
J01CA04	Amoxicillin	dispergibel tablet	500 mg	Kan deles for at lette indtagelsen
J01CF01	Dicloxacillin	kapsel	250 mg	
			500 mg	

MIDLER MOD INFETIONER – CEFALOSPORIN:

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
J01DD04	Ceftriaxon	pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning‡	1 g	10 stk. á 1 g i 10 ml hætteglas* Dosis er 2 g (2 hætteglas) til voksne Kan rekvireres i styrken 2 g ved restordre på 1 g

‡ Intramuskulær (i.m.) indgift bør kun anvendes, hvis ceftriaxon ikke kan gives intravenøst (i.v.), idet stoffet er stærkt lokalirriterende. Der bør anvendes opløsning tilsat lokalanalgetikum (lidokain) ved opblanding til i.m. indgift. Denne lidokainchlorid-opløsning må kun anvendes i.m. og ikke gives i.v., jf. instruktion på www.pro.medicin.dk.

* Ved første rekvirerende læge faktureres regionen for hele pakningen samt for delpakningsgebyr. Der udleveres 2 portioner (2 x 1 g) i hætteglas med en volumen på min. 10 ml. Ved rekvirering fra de efterfølgende læger faktureres regionen alene for delpakningsgebyr og lægerne får hver udleveret 2 portioner.

ANTIVIRALE MIDLER:

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
J05AB01	Aciclovir	tablet	400 mg	KUN til herpes zoster

SMERTESTILLENDENDE MIDLER – OPIOIDER:

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
N02AA01	Morphin	injektionsvæske, opløsning	20 mg/ml	Ved restordre kan 10 mg/ml rekvireres
		tablet	10 mg	

SMERTESTILLENDENDE MIDLER – ANDRE:

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
N02BE01	Paracetamol	tablet	500 mg	
		suppositorium	125 mg	
			250 mg	
M01AE01	Ibuprofen	tablet	400 mg	
M01AB05	Diclofenac	suppositorium	50 mg	
			100 mg	
M01AB15	Ketorolac	injektionsvæske, opløsning	30 mg/ml	Fx Toradol
N02CC01	Sumatriptan	tablet	50 mg	

ANTIEMETIKA:

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
A03FA01	Metoclopramid	injektionsvæske, opløsning	5 mg/ml	Primperan® Max 10 mg x 3 dagligt i max 5 dage pga. risiko for neurologiske bivirkninger
A03FA01	Metoclopramid	tablet	10 mg	- Max 10 mg x 3 dagligt i max 5 dage pga. risiko for neurologiske bivirkninger

ANTIPARKINSON MIDLER:

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
N04AA02	Biperiden	injektionsvæske, opløsning	5 mg/ml	Akineton®

MIDLER MOD MAVESÅR:

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
A02BC02	Pantoprazol	enterotablet	20 mg	OBS. KUN styrken 20 mg må rekvireres

ANTIALLERGIKA:

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
H02AB04	Methylprednisolon-succinat	pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning	40 mg	Solu-medrol tørstof + solvens.
H02AB04	Methylprednisolon-acetat	injektionsvæske, suspension	40 mg/ml	Depo-Medrol® OBS. KUN til lokale inflammatoriske tilstande og ikke til sæsonbetingede allergiske sygdomme
C01CA24	Adrenalin	injektionsvæske, opløsning	1 mg/ml	IKKE autoinjektor som Epipen/Jext/Emerade
R06AA04	Clemastin	injektionsvæske, opløsning	1 mg/ml	
R06AE07	Cetirizin	tablet	10 mg	

HJERTEMEDICIN:

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
C03CA01	Furosemid	injektions- og infusionsvæske, opl.	10 mg/ml	tørstof + solvens.
C03CA01		tablet	40 mg	
B01AC06	Acetylsalicylsyre	tablet	150 mg	OBS. IKKE 75 mg 2 tabletter á 150 mg tygges v. AMI-mistanke
C01DA02	Glyceryltrinitrat	sublingual spray	0,4 mg/dosis	

ASTMA-/KOL MIDLER

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
H02AB06	Prednisolon	tablet	25 mg	
R03AC02	Salbutamol	inhalationsspray, suspension	0,1 mg/dosis	
R03CC02		injektionsvæske	0,5 mg/ml	
R03CC02		oral opløsning	0,4 mg/ml	

PSYKOFARMAKA:

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
N05BA04	Oxazepam	tablet	15 mg	
N05AH03	Olanzapin	pulver til injektionsvæske, opløsning	10 mg	Zyprexa®
N05AX08	Risperidon	tablet	0,5 mg	<i>Kun til kortvarig behandling af aggressive, fysisk voldelige, psykotiske eller særlig forpinte patienter med demens</i>
N05BA01	Diazepam	emulsion, injektionsvæske	5 mg/ml	
N05BA01	Diazepam	rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder	5 mg/dosis	
N05BA01	Diazepam	rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder	10 mg/dosis	
N05CD08	Midazolam	injektions- og infusionsvæske, opløsning	1 mg/ml	

ØJENMIDLER:

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
S01AA01	Chloramphenicol	øjendråber, opløsning	5 mg/ml	Enkeltdosis-beholdere, 30 x 0,25 ml (Kloramfenikol 'Santen') <i>Ved restordre kan flerdosisbeholdere med chloramphenicol rekvireres</i>
S01BC03	Diclofenac	øjendråber, opløsning	1 mg/ml	Voltabak
S01JA51	Combiflare (Oxybuprocainhydrochlorid, Fluorescein)	øjendråber	1,25 mg/ml + 3 mg/ml	Combiflare øjendråber, 5 ml.

DIVERSE:

ATC-kode	Lægemiddelstof	Lægemiddelform	Styrke	Præparateksempel /kommentarer
A03BA01	Atropin	injektionsvæske, opløsning	1 mg/ml	
A03AB02	Glycopyrroniumbromid	injektionsvæske, opløsning	0,2 mg/ml	Fx Robinul
H04AA01	Glucagon	pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning	1 mg	Glucagen Hypokit
N01BB02	Lidocain	injektionsvæske, opløsning	10 mg/ml	<i>Ved restordre kan anden styrke rekvireres</i>

N01BB52	Lidocain og adrenalin	injektionsvæske, opløsning	10 mg/ml og 5 µg/ml	Fx Xylocain-Adrenalin®. Opbevares ved 2-15 °C. Efter åbning: 3 dage Ved restordre rekvireres: -- Lidokain-adrenalin "SAD", injektionsvæske 10 mg/ml + 5 µ/ml fra sygehusapotek ELLER - Carbocain-Adrenalin® 10 mg/ml + 5 µg/ml
V07AB	Natriumchlorid	solvens til parenteral anvendelse	9 mg/ml	IKKE infusionsvæsker
V07AB	Vand (sterilt)	solvens til parenteral anvendelse		Fx Sterilt Vand Mini-plasco®
A06AG11	Natriumcitrat og natriumlaurylsulfoacetat	rektalvæske, opløsning, endosisbeholder	9 mg/ml + 90 mg/ml	Microlax®
B02BA01	Phytomenadion	injektionsvæske, opløsning	10 mg/ml	Konakion® Novum