

# VACCINATIONSPROCESSEN

## - Anbefalinger til almen praksis

Er baseret på viden om, hvor det oftest går galt

### Ved tidsbestilling:

- Tjek, om der er bestilt tid til korrekt vaccination i DDV

### Ved vaccination:

- Tjek patientens CPR.nr./brug evt. scanner
- Hav kun den aktuelle patients journal åben
- Hav kun én patient, der skal vaccineres i konsultation, ad gangen
- Tjek, vaccinationskort, DDV og journalnotat før indgift
- Kontrollér vaccinen mod opslaget
- Få patientens samtykke (ved børn skal samtykke være udtrykkeligt)
- Spørg patient eller forældre om indikation
- Samme person finder, forbereder og giver vaccinen
- Giv vaccinen straks efter, den er trukket op

### Efter vaccination:

- Patient skal vente 10-15 minutter under opsyn
- Hav en procedure for håndtering af anafylaksi, som alt klinikpersonale kender

### Vær særlig opmærksom:

- Når der gives 2 vacciner, der ikke må blandes eller gives samme sted
- Ved ændringer i vaccinationstidspunkt og indhold i vacciner
- Når du skal vaccinere ved hjemmebesøg

### Generelle anbefalinger

- Lav en lokal vejledning for vaccinationsprocessen
- Husk at introducere nyt personale til vejledningen
- Opdel vaccinationskøleskabet
- Hav opdateret udgave af Børnevaccinationsprogram på vaccinationskøleskab

# VACCINATIONSPROCESSEN

## - Utilsigtede hændelser rapporteret fra almen praksis

Der sker ofte utilsigtede hændelser ved vaccination.

Heldigvis rapporterer praksisklinikker mange af disse hændelser, der beskriver hvor det oftest går galt:

- **Revaccination** - patient er allerede vaccineret med pågældende vaccine
- **Registrering af vaccine** - vaccination registreres ikke, registreres forkert eller tjekkes ikke i journal, DDV eller på vaccinationskort
- **Forkert patient** - forveksling mellem patienter
- **Forveksling** - af præparat, styrke, emballage eller vaccinationstidspunkt for børn
- **Blandingsfejl** - kun en af tokomponentvaccine gives eller kun solvens gives
- **Indgiftssted** - flere vacciner gives samme sted, hvor dette er kontraindiceret
- **Vaccinekøleskab** - manglende overblik
- **Vacciner blandes om morgenen** - vacciner har begrænset holdbarhed efter opblanding og bør blandes lige inden indgift

### Hvis skaden er sket...

- Er patienten ikke eller kun delvis vaccineret, indkaldes patienten igen.
- Har patienten fået forkert vaccine og/eller har du spørgsmål til bivirkninger eller revaccination
  - kontakt: Statens Serum Institut Tlf.: 32 68 32 68
- Du kan også finde information på [www.ssi.dk/Vaccination/Boernevaccination](http://www.ssi.dk/Vaccination/Boernevaccination)
- Husk at rapportere en utilsigtet hændelse

Har du spørgsmål om patientsikkerhed eller utilsigtede hændelser, kan du få sparring hos din risikomanager. Læs mere på [sundhed.dk](http://sundhed.dk)