

Tabel 2

Differentialdiagnoser

Differentialdiagnoser	Mistænkes ved	Initiel undersøgelse
Depression, angst, stress	Klinisk opmærksomhed	Som vanligt
Inflammatorisk tarmsygdom	Familiær disp., blod i aff., patologisk biokemi	Fæces-calprotectin eller endoskopi
Laktoseintollerans	Anden etnisk baggrund, synlig svær oppustethed	Gentest
Mikroskopisk kolit	Kvinder, invaliderende mange afføringer dagligt	Koloskopi med biopsier
Galdesyremalabsorption	Invaliderende mange afføringer dagligt eller tidl. cholecystectomy	Behandlingsforsøg med cholestyramin/henvis ved stærk mistanke
Cøliaki	Svær oppustethed eller invaliderende mange afføringer dagligt	Transglutaminase IgA og total IgA
Medikamentielt udløst	Tidsmæssig sammenhæng	Pausere mistænkte præparat
Bakteriel overvækst	Synlig svær oppustethed	Pusteprobe
Clostridium difficile infektion	Debut efter antibiotikakur	Afføringsdyrkning
Parasitær infektion	Rejseanamnese	Afføringsdyrkning
Laksantiamisbrug	Klinisk mistanke	Urinscreening for laksantia (positiv hos 8 % af henviste til gas. amb med diarre)
Børneorm	Analkløe eller infektion i familien	Analinspektion/analskrab /tapeprøve
Colon cancer	Familiær disposition til cancer/tidl. cancer	Koloskopi