

Udtrapning af clonazepam (Rivotril) efter langvarig behandling

Forslag til udtrapning efter 1-2 års behandling.

Reducer med 0,5 mg hver 4. uge eller 0,25 mg hver 2. uge.

Trin	Morgen	Middag	Aften	Totaldosis	Dosering med tabletter a 0,5 mg
0	2 mg	2 mg	2 mg	6 mg	4 + 4 + 4
1 (4 uger)	2 mg	1,5 mg	2 mg	5,5 mg	4 + 3 + 4
2 (4 uger)	1,5 mg	1,5 mg	2 mg	5 mg	3 + 3 + 4
3 (4 uger)	1,5 mg	1,5 mg	1,5 mg	4,5 mg	3 + 3 + 3
4 (4 uger)	1,5 mg	1 mg	1,5 mg	4 mg	3 + 2 + 3
5 (4 uger)	1 mg	1 mg	1,5 mg	3,5 mg	2 + 2 + 3
6 (4 uger)	1 mg	1 mg	1 mg	3 mg	2 + 2 + 2
7 (4 uger)	1 mg	0,5 mg	1 mg	2,5 mg	2 + 1 + 2
8 (4 uger)	0,5 mg	0,5 mg	1 mg	2 mg	1 + 1 + 2
9 (4 uger)	0,5 mg	0,5 mg	0,5 mg	1,5 mg	1 + 1 + 1
10 (2 uger)	0,5 mg	0,25 mg	0,5 mg	1,25 mg	1 + ½ + 1
11 (2 uger)	0,25 mg	0,25 mg	0,5 mg	1 mg	½ + ½ + 1
12 (2 uger)	0,25 mg	0,25 mg	0,25 mg	0,75 mg	½ + ½ + ½
13 (2 uger)	0,25 mg	0 mg	0,25 mg	0,5 mg	½ + 0 + ½
14 (2 uger)	0 mg	0 mg	0,25 mg	0,25	0 + 0 + ½
15 (2 uger)	0 mg	0 mg	0 mg	0 mg	0 + 0 + 0

Ud fra denne plan er behandlingen seponeret efter ca. 1 års nedtrapning.

Der kan være behov for individuelle justeringer af tempoet i nedtrapningen.

Hvis behandlingen med clonazepam har varet længere eller dosis har været højere, da kan det være nødvendigt af fordoble intervallerne.

Har patienten fået Rivotril i en kort periode kan udtrapningen normalt gå hurtigere.