

# Meningitis

## – behandling før indlæggelse



PRAKTISERENDE  
LÆGERS  
ORGANISATION

REGION  
SJÆLLAND



*- vi er til for dig*

## Anbefalet behandling

### Voksne

Benzylpenicillin:

3 g (5 mill. IE) i.v. opløst i 25 ml sterilt vand.

Alternativt gives i.m. efter opløsning i 10 ml lidocainhydrochlorid 10 mg/ml injektionsvæske. **Lidocainhydrochlorid må ikke gives i.v.**

### Børn

Benzylpenicillin i.v./i.m./i.o.:

3 g (5 mill. IE) i.v. opløses i 10 ml sterilt vand.

Udtag mængde svarende til dosis:

- **Børn 10-14 år.** 4 mill. IE (2,4 g) (8 ml opløsning)
- **Børn 1-9 år.** 2 mill. IE (1,2 g) (4 ml opløsning)
- **Børn < 1 år.** 1 mill. IE (0,6 g) (2 ml opløsning)

## Anbefalet behandling

### VED PENICILLINALLERGI

#### Voksne

Ceftriaxon:

2 g i.v. opløst i 20 ml sterilt vand.

Alternativt gives i.m. (1 g opløses i 3,5 ml lidocainhydrochlorid injektionsvæske 10 mg/ml, og der injiceres 1 g i hver side, fx lårets yderside).

**Lidocainhydrochlorid må ikke gives i.v.**

#### Børn > 4 uger

Ceftriaxon 50 mg/kg i.v.

Opløses i 20 ml sterilt vand. Udtag mængde svarende til dosis.

#### Børn < 4 uger

Cefotaxim 50 mg/kg

(hvis cefotaxim ikke er tilgængeligt, gives Ceftriaxon 50 mg/kg i.v./i.m./i.o.)

Juni 2020

**Region Sjælland**  
**Det Nære Sundhedsvæsen**

Alléen 15

4180 Sorø

Telefon 70 15 50 00

[www.regionsjaelland.dk](http://www.regionsjaelland.dk)

[Imenheden@regionsjaelland.dk](mailto:Imenheden@regionsjaelland.dk)