



11. maj 2016

Lene Henneberg Rysgaard
Sekretær
tlf. 97 66 49 01
lehej@rn.dk

Ny forbedret formel til beregning af eGFR fra den 12. maj 2016

De klinisk biokemiske afdelinger på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland indfører pr. 12. maj 2016 en ny og forbedret formel til beregning af eGFR baseret på P-Kreatinin hos voksne over 17 år. Dette sker i forlængelse af nye guidelines udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Ændringen sker samtidigt i hele Region Nordjylland og er gennemført i Region Midtjylland pr. 2. maj 2016.

Ændringen medfører ingen ændringer af referenceintervallerne, men giver bl.a. et bedre estimat af eGFR hos patienter under 65 år. Analysen får en ny linje i LABKA og i de elektroniske patientjournaler.

De nye guidelines "Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering" kan hentes på de tre nationale selskabers hjemmesider (f.eks. www.dskb.dk).

Med venlig hilsen

Axel Brock
Overlæge, dr.med.

Klinisk Biokemi, Aalborg