

Skema til vurdering af effekt af midler mod overaktiv blære.

Sæt ring om det svar, der passer mest på dig.

	Før du stopper med medicinen				Efter 4 uger uden medicin		
	Hvordan har dine blæresymptomer været den sidste uge ?				Hvordan har dine blæresymptomer været den sidste uge ? Er der en ændring siden sidst?		
Hvor lang tid går der højest mellem hver vandladning fra du vågner til du går i seng?	Mere end 3 timer	2-3 timer	1-2 timer	Mindre end 1 time	Længere tid	Samme tid	Kortere tid
Hvor mange gange skal du op og lade vandet om natten?	0 gange	1-2 gange	3-4 gange	5 eller flere	Færre gange	Det samme	Flere gange
Oplever du en pludselig og stærk vandladningstrang?	Nej aldrig	Sjældent	Dagligt	Hver gang jeg skal lade vandet	Færre gange	Det samme	Flere gange
Er vandladningstrangen så kraftig, at du ikke kan holde på vandet, indtil du når på toilettet (ufrivillig vandladning)?	Nej aldrig	Sjældent	Dagligt	Hver gang jeg skal lade vandet	Færre gange	Det samme	Flere gange
Hindrer dine blæresymptomer dig i at gøre, hvad du vil?	Nej aldrig	Sjældent	Flere gange om ugen	Dagligt	Sjældnere	Det samme	Hyppigere
Har du bivirkninger til medicinen, fx. - mundtørhed - forstoppelse - sløret syn - søvnighed - andet _____ Markér hvilke.	Nej aldrig	Sjældent	Flere gange om ugen	Dagligt	Sjældnere	Det samme	Hyppigere