

Astma behandling børn 6 - 14 (18) år

AstraZeneca

Trin 1	Trin 2	Trin 3	Trin 4	Trin 5
Beta-2-agonist p.n.		Bricanyl turbuhaler 0,5 mg	højst x 4-6 dagl [~]	
	<i>Spirocort turbuhaler</i> 100 mikg x 2	<i>Spirocort turbuhaler</i> 200 mikg x 2	<i>Spirocort turbuhaler</i> 200 mikg x 2 - og <i>Oxis turbuhaler</i> 4,5 mikg x 2 (**)	Barn forventes være henvist til Specialistniveau
	Singulair 5mg x 1 (*) [~]	<i>Spirocort turbuhaler</i> 100 mikg x 2 - og Singulair 5 mg x 1 (*)	<i>Spirocort turbuhaler</i> 200 mikg x 2 - og Singulair 5 mg x 1 (*)	Overvej at tillægge peroral prednisolon
		<i>Spirocort turbuhaler</i> 400 mikg x 2	<i>Spirocort turbuhaler</i> 400 mikg x 2 - og <i>Oxis turbuhaler</i> 4,5 (evt. 9) mikg x 2 (**)	Overvej at tillægge anti-IgE
			<i>Spirocort turbuhaler</i> 400 mikg x 2 - og Singulair 5 mg x 1 (*)	Overvej at tillægge teofyllin
			<i>Spirocort turbuhaler</i> 400 mikg x 2 - og Singulair 5 mg x 1 (*) - og <i>Oxis turbuhaler</i> 4,5 (evt. 9) mikg x 2 (**)	

Fast forebyggende behandling startes normalt på Behandlingstrin 2 evt. trin 3.

Børn fra 6 års alderen kan normalt anvende pulverinhalatorer.

Kursivering: det primære valg på dette trin.

* Til børn over 14 år anvendes Singulair 10 mg x 1.

** Når Spirocort og Oxis anvendes sammen skiftes med fordel til kombinationsproduktet Symbicort (NB mange doseringskombinationer).

Astma behandling børn 6 - 14 (18) år

AstraZeneca

Præparatfortegnelse:

Bricanyl (terbutalin) turbuhaler 0,25 mg og 0,5 mg

Spirocort (budesonide) turbuhaler 100 mikg, 200 mikg og 400 mikg

Oxis (formoterol) turbuhaler 4,5 mikg og 9 mikg

Symbicort (formoterol og budesonide) turbuhaler 4,5 mikg/80 mikg, 4,5 mikg/160 mikg og 9 mikg/320 mikg

Singulair (montelukast) 4 mg, 5 mg og 10 mg