

Astma behandling børn 6 - 14 (18) år

GlaxoSmithKline

Trin 1	Trin 2	Trin 3	Trin 4	Trin 5
Beta-2-agonist p.n.		Ventoline diskos 0,2 mg højst x 4-6 dagl [~]		
	<i>Flixotide diskos</i> 50 mikg x 2	<i>Flixotide diskos</i> 100 mikg x 2	<i>Flixotide diskos</i> 100 mikg x 2 - og <i>Serevent</i> 50 mikg x 2 (**)	Barn forventes være henvist til Specialistniveau
	Singulair 5mg x 1 (*) [~]	Flixotide diskos 50 mikg x 2 - og Singulair 5 mg x 1 (*)	Flixotide diskos 100 mikg x 2 - og Singulair 5 mg x 1 (*)	Overvej at tillægge peroral prednisolon
		Flixotide diskos 100 mikg x 2 - og Singulair 5 mg x 1 (*)	Flixotide diskos 250 mikg x 2 - og Serevent 50 mikg x 2 (**)	Overvej at tillægge anti-IgE
		Flixotide diskos 250 mikg x 2	Flixotide diskos 250 mikg x 2 - og Singulair 5 mg x 1 (*)	Overvej at tillægge teofyllin
			Flixotide diskos 250 mikg x 2 - og Singulair 5 mg x 1 (*) - og Serevent 50 mikg x 2 (**)	

Fast forebyggende behandling startes normalt på Behandlingstrin 2 evt. trin 3.

Børn fra 6 års alderen kan normalt anvende pulverinhalatorer.

Kursivering: det primære valg på dette trin.

* Til børn over 14 år anvendes Singulair 10 mg x 1.

** Når Flixotide og Serevent anvendes sammen skiftes med fordel til kombinationsproduktet Seretide.

Astma behandling børn 6 - 14 (18) år

GlaxoSmithKline

Præparatfortegnelse:

Ventoline (salbutamol) diskos 0,2 mg

Flixotide (fluticason) diskos 50 mikg, 100 mikg, 250 mikg og 500 mikg

Serevent (salmeterol) diskos 50 mikg

Seretide (salmeterol og fluticason) diskos 50 mikg/100 mikg, 50 mikg/250 mikg og 50 mikg/500 mikg

Singulair (montelukast) 4 mg, 5 mg og 10 mg