

Astma behandling børn 6 - 14 (18) år

TEVA

Trin 1	Trin 2	Trin 3	Trin 4	Trin 5
Beta-2-agonist p.n.		Airomir autohaler 0,1 mg eller Salamol 100 mikg højst x 4-6 dagl [~]		
	<i>AeroBec autohaler</i> 50 mikg x 2	<i>AeroBec autohaler</i> 100 mikg x 2	<i>AeroBec autohaler</i> 100 mikg x 2 - og <i>Oxis turbuhaler</i> 4,5 mikg x 2 (**)	Barn forventes være henvist til Specialistniveau
	Singulair 5mg x 1 (*) [~]	<i>AeroBec autohaler</i> 50 mikg x 2 - og Singulair 5 mg x 1 (*)	<i>AeroBec autohaler</i> 100 mikg x 2 - og Singulair 5 mg x 1 (*)	Overvej at tillægge peroral prednisolon
		<i>AeroBec autohaler</i> 200 mikg x 2	<i>AeroBec autohaler</i> 200 mikg x 2 - og <i>Oxis turbuhaler</i> 4,5 mikg x 2 (**)	Overvej at tillægge anti-IgE
			<i>AeroBec autohaler</i> 200 mikg x 2 - og Singulair 5 mg x 1 (*)	Overvej at tillægge teofyllin
			<i>AeroBec autohaler</i> 200 mikg x 2 - og Singulair 5 mg x 1 (*) - og <i>Oxis turbuhaler</i> 4,5 mikg x 2 (**)	

Fast forebyggende behandling startes normalt på Behandlingstrin 2 evt. trin 3.

Børn fra 6 års alderen kan normalt anvende autohaleren.

Kursivering: det primære valg på dette trin.

* Til børn over 14 år anvendes Singulair 10 mg x 1.

** Alternativt til Oxis kan anvendes Serevent. Det kan overvejes når Aerobec og Oxis/Serevent anvendes sammen at skifte til Innovair til spacer.

Astma behandling børn 6 - 14 (18) år

TEVA

Præparatfortegnelse:

Airomir (salbutamol) autohaler 0,1 mg

Salamol (salbutamol) 100 mikg

AeroBec (beclometasondipropionat) autohaler 50 mikg og 100 mikg

Oxis (formoterol) turbuhaler 4,5 mikg og 9 mikg

Serevent (salmeterol) diskos 50 mikg

Innovair 100/6 mikg

Singulair (montelukast) 4 mg, 5 mg og 10 mg