

DESKGUIDE

Stadieinddeling og behandling af KOL i stabil fase (FEV ₁ /FVC <70%)						Basisliste Udarbejdet i samarbejde med IRF og overlæger Johnna Steentoft og overlæge Asbjørn Høegholm
Stadium	0: risiko	1: mild	2: moderat	3: svær	4: meget svært	
Spirometri, ydelsesnr. 7113	FEV ₁ /FVC: Normal FEV ₁ : Normal*	FEV₁: >80%*	FEV₁: 50 - 80%*	FEV₁: 30-50%*	FEV₁: <30%*	
Symptomer: Hoste/slim	Åndenød: Nej	Åndenød: +/-	Åndenød: +	Åndenød: ++	Åndenød: +++	
Behandling	Rygeophør – Influenzavaccination					
	Korttidsvirkende bronkodilatator ved behov. Kontrol af inhalationsteknik					Berodual/Combi vent. Bricanyl/ventoline (hvis patienten får Spiriva)
	Tilføj en eller flere langtidsvirkende bronkodilatatorer. Rehabilitering					Serevent/Foradil /Oxis/ Spiriva
	Tilføj inhaleret binyrebarkhormon, hvis flere exacerbationer					Spirocort 800 µg x 2 Flicotide 500 µg x 2
					Hjemmeilt? Kirurgisk behandling. Specialist vurdering	

*FEV₁ i forhold til forventet for køn, alder og højde.

Kilde: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD): Global strategy for the diagnosis, management, and prevention and chronic obstructive pulmonary disease. Workshop report, 2003 update.