

Tværfagligt risikovurderingsskema (RVS) til scoring af patienter med akut hjerneskade:

Navn/adresse og CPR-nummer	
Dato for vurdering	
Vurdering nr.	
Vurdering foretaget af (navne, stillingsbetegnelse)	

Det er afgørende, at alle felter udfyldes, også selvom man er i tvivl. I skemaet anvendes Glasgow Coma Scale score til vurdering af bevidsthedsniveauet, og da ikke alle bruger den rutinemæssigt, er den vedhæftet
Skemaer, der ikke er udfyldt korrekt, bliver returneret

		A	B	C	D	
	Funktionsnedsættelse	Svær	Moderat	Let	Ingen	Score
FYSISKE FUNKTIONER	F1 Endokrinologi	Hormonsubstitution (flere præparater) Diabetes Insipidus (vanskelig væskekontrol/daglig styring) Score: 5	Diabetes Mellitus Diabetes Insipidus (lettere/fuld kontrol) Kortisonsubstitution Score: 3			
	F2 Væskebalance	Total parenteral ernæring. Vanskeligt at opnå væskebalance. Må korrigeres dagligt Score: 3	Total enteral ernæring/daglig styring af væskebalance Score: 2	Ikke behov for styring af væskebalance Score: 0		
	F3 Blodtryk	Svær blodtrykskontrol Systolisk > 160 mmHg < 100 mmHg trods medicinsk behandling Score: 4	Overvejende normalt blodtryk Score: 0	Blodtrykket normalt Score: 0		
	F4 Infektion	Fortsatte feberperioder (evt mistanke om aspirationspneumoni) Score: 4	Tidligere feberperioder (specielt CNS infektioner, shuntinfektioner eller andre typer implantater) Score: 2			
	F5 Svært multitraume	Læsioner i flere organsystemer Score: 3				
	F6 Autonom dysfunktion • Dystoni ekstremitetstonus • Hypertensive perioder • Tachycardiperioder • Tachypnoeperioder • Hyperpyrexiperioder • Synligt svedudbrud	Periodevis vekslende tilstedeværelse af flere symptomer under F6: Dystoni (øget tonus i ekstemitets- eller halsmuskulatur) betyder akut behov for udredning og behandling Score: 6				
	F7 Ernæring/vægttab	Vægttab ≥ 20% Score: 4	Vægttab ≥ 10% men < 20% Score: 2	Vægttab mellem 5 og 10 % Score: 1		
	F8 Dysfagi/luftveje	- Tracheostomi med cuff - Behov for kontinuerligt BIPAP Score: 6	Tracheostomi uden cuff Patienten har aspirationsrisiko Patienten skal udredes for dysfagi Der skal anlægges PEG sonde Score: 4	Tilpasset kost og væske (patienten er udredt for dysfagi) Lille risiko for aspiration Score: 1		
	F9 Muskeltonus (Autonom dysfunktion (se F 6) skal altid overvejes som mulig diagnose i forhold til alene øget muskeltonus)	Svær øget tonus Spasticitet, smerter Behov for intratecal baclofenbehandling Behov for botox-behandling Score: 6	Moderat øget tonus Passiv ledbevægelighed er ikke normal (f.eks spidsfod) Evnetuel intrathecal baclofentest er nødvendig Score: 3	Let øget tonus Normal passiv ledbevægelighed Ingen smerter Score: 0		
	F10 Ekstremitetsparese	Tetraparese Score: 6	Svær hemiparese/paralyse Score: 1	Let parese. Score: 0		

Patientnavn

		A	B	C	D	
	Funktionsnedsættelse	Svær	Moderat	Let	Ingen	Score
MENTALE FUNKTIONER	M1 Bevidsthedsniveau	Glasgow Coma Score 3-8 Patienter i denne kategori <u>scorer altid maksimal score i M- og A-området = Alle felter skal udfyldes</u> Score: 6	Glasgow Coma Score 9-13 Score: 5	Glasgow Coma Score 14 Score: 1	Glasgow Coma Score 15 = ingen bevidsthedspåvirkning Score: 0	
	M2 Orienteringsevne (tid, sted og erkendelse af sig selv og andre)	Ingen erkendelse Score: 6	Usikker erkendelse Score: 5	Intet problem Score: 0	Score: 0	
	M3 Energi og handlekraft (motivation og impulsstyring)	Passiv eller impulsstyret Udadreagerende/ agiteret adfærd Score: 6	Moderate forstyrrelser Nogen målrettet aktivitet Score: 5	Lette forstyrrelser Score 2	Score: 0	
	M4 Opmærksomhed	Svære koncentrations- og opmærksomhedsforstyrrelser. Reagerer ikke på eksterne stimuli. Konfusion Konfabulation Score: 6	Moderate koncentrations- og opmærksomheds forstyrrelser. Latenstid Varierende indsigt Score: 5	Lette koncentrations- og opmærksomheds forstyrrelser. Score: 2	Score: 0	
	M5 Hukommelse	Svære hukommelsesforstyrrelser Ingen tegn på lagring af information Score: 4	Moderate hukommelsesforstyrrelser Score: 2	Lette hukommelsesforstyrrelser Score: 1	Score: 0	
	M6 Sprog	Svær afasi Score: 4	Moderat afasi Score: 2	Let afasi Score: 1	Score: 0	
	M7 Andre overordnede kognitive funktioner (apraksi, neglekt, nedsat evne til organisering og planlægning)	Svære kognitive forstyrrelser Score: 5	Moderate kognitive forstyrrelser Score: 3	Lette kognitive forstyrrelser Score: 1	Score: 0	

Patientnavn

		A	B	C	D	
	Funktionsnedsættelse	Svær	Moderat	Let	Ingen	Score
AKTIVITET OG DELTAGELSE	A1 Tilegnelse af færdigheder	Ingen tegn på udvikling af færdigheder Score: 5	Tilegner sig nyt med moderat støtte Score: 3	Tilegner sig nyt med let støtte Score: 1	Score: 0	
	A2 Problemløsning	Ingen tegn på selvstændig problemløsning Score: 3	Problemløser med moderat støtte Score: 2	Problemløser med let støtte Score: 1	Score: 0	
	A3 Kommunikation (forstå og udtrykke sig verbalt/nonverbalt)	Ingen tegn på målrettet kommunikation Score: 3	Kommunikerer usikkert og med latenzid Score: 2	Kommunikerer med let støtte Score: 1	Score: 0	
	A4 Omsorg for sig selv	Ingen selvstændig funktion Score: 3	Behov for moderat støtte Score: 2	Behov for let støtte Score: 1	Score: 0	
	A5 Forflytning og mobilitet	Ingen selvstændig funktion Score: 3	Behov for assistance fra en eller flere personer. Score: 2	Behov for nogen assistance, hjælpemidler eller ekstra tidsforbrug Score: 1	Score: 0	
	A6 Udføre daglige rutiner	Ingen selvstændig funktion Score: 2	Behov for moderat støtte Score: 1	Behov for let støtte Score: 0	Score: 0	
	A7 Social interaktion og samvær	Ingen selvstændige initiativer Ingen relevant interaktion Score: 5	Moderate vanskeligheder Score: 4	Lette vanskeligheder Score: 2	Score: 0	
Sum-score (tæl sammen)					----->	

Andre scoringer og tests

Dato							
FIM							
RLAS							
EFA							

Patientnavn