

Børnebasislisten for Praksissektoren

Oktober 2023



- Dette er en forkortet tekst. Den fulde version, som opdateres løbende, findes på [Medicinfunktionen.dk](https://www.medicinfunktionen.dk)
- Listen giver forslag til 1. valg af lægemidler til børn i alderen 28 dage til og med 17 år i Region Hovedstaden til udvalgte indikationer.
- Aldersgrænserne angivet på Børnebasislisten er de myndighedsgodkendte hentet fra produktresuméerne. Off-label brug af lægemidler kan anbefales, hvis det vurderes relevant
- Kriterierne for valg af præparat til listen er dokumentation for effekt og bivirkninger samt hensynet til tilgængelige og alderssvarende lægemiddelformer, styrke, pris, vurdering af tilsætningsstoffer og klinisk praksis. Desuden skal de anbefalede lægemidler på Børnebasislisten som udgangspunkt have en markedsføringsstilladelse med godkendt pædiatrisk indikation og have udvist prisstabilitet.
- Anbefalingerne koordineres med anbefalingerne i Rekommandationslisten for Børn og Unge for Region Hovedstadens hospitaler.
- Listen er udarbejdet af Medicinfunktionen, Klinisk Farmakologisk Afdeling i samarbejde med den Regionale Børnelægemiddelkomité.

Lægemiddelgruppe	Anbefalet lægemiddel (handelsnavn)	Lægemiddelform og styrke	Godkendt alder*
OBSTIPATION			
Osmotisk virkende laksantia	Lactulose Medilax® Macrogol Komb. (Lacrofarm Junior®)	oral opløsning, 667 mg/ml pulver til oral opløsning	Alle aldre Fra 2 år
Peristaltikfremmende laksantia	Natriumpicosulfat (Laxoberal) ¹	orale dråber, 7,5 mg/ml	Alle aldre
Laksantia med lokal virkning	Docusat + Glycerol (Glyoktyl®) ²	rektaltube, 6+906 mg/ml	Alle aldre
Børn over 12 år behandles som voksne, hvormed der henvises til Basislisten om obstipation for voksne.			
INFEKTIONER – Akut otitis media, tonsillitis, pneumoni			
V-penicillin	Phenoxyethylpenicillin (billigste generikum, fx Primcillin) (billigste generikum, fx Primcillin) (billigste generikum, fx Pancillin) Phenoxyethylpenicillin tabletter kan knuses eller opslæmmes i vand.	oral suspension 50 mg/ml tabletter 400 mg, 800 mg tabletter 500.000 IE, 1 MIE	Ingen nedre alder anført
Ved penicillinallergi: Makrolid	Clarithromycin (Klacid) Clarithromycin (billigste generikum) Roxithromycin (billigste generikum)	oral suspension 25 mg/ml, 50 mg/ml tabletter 250 mg, 500 mg tabletter 150 mg, 300 mg	Fra 6 mdr. Fra 12 år Fra 40 kg
INFEKTIONER – Akut otitis media – Lokalbehandling ved tympanostomi-dræn			
Quinolon + steroid	Ciprofloxacin + fluocinolonacetonid (billigste generikum, Cetraxal Comp) ³ Ciprofloxacin + dexamethason (billigste generikum, fx Ciloxadex) ⁴	øretråber 3+0,25 mg/ml øretråber 3+1 mg/ml	Fra 6 mdr. Fra 6 mdr.
Quinolon	Ciprofloxacin (billigste generikum, Ciloxan) ^{4,5}	øretråber 3 mg/ml	Over 1 år
INFEKTIONER – Cystitis			
Penicillin med virkning på gramnegative stave	Pivmecillinam (billigste generikum, fx Penomax)	tabletter 200 mg, 400 mg	Fra 2 år
Ved penicillinallergi eller hvis tabletter ikke kan anvendes: Antimikrobielt middel til UVI	Nitrofurantoin Trimethoprim (Trimopan) ³	tabletter 50 mg oral suspension 10 mg/ml	Fra 2 år Fra 2 år
Pivmecillinam tabletter og nitrofurantoin tabletter kan knuses eller opslæmmes i vand.			
Lægemiddelanbefalingerne givet her på Børnebasislisten vedr. cystitis er for børn over 2 år før resistenssvar foreligger. Børn under 2 år henvises altid til børneafdelingen jf. henvisningskriterier i forløbsbeskrivelse om urinvejsinfektion hos børn.			

* Aldersgodkendelse jævnfør produktresumé.

1 Actilax orale dråber anbefales ikke som 1. valg, da de indeholder methyl p-hydroxybenzoate, som kan give en allergisk reaktion.

2 Glyoktyl rektaltube indeholder methyl parahydroxybenzoat, som kan give en allergisk reaktion.

3 Øredråber med ciprofloxacin + fluocinolonacetonid i dråbeflaske og Trimopan oral suspension indeholder methyl- og propyl- parahydroxybenzoat, som kan give en (typisk forsinket) allergisk reaktion.

4 Øredråber med ciprofloxacin +/- dexamethason indeholder benzalkoniumchlorid, der kan medføre lokal irritation.

5 Off-label indikation.

Lægemiddelgruppe	Anbefalet lægemiddel (handelsnavn)	Lægemiddelform og styrke	Godkendt alder*
INFEKTIONER – Impetigo			
Desinfektionsmiddel	Klorhexidin	creme, sæbe	
Penicillinasestabil: penicillin	Dicloxacillin (billigste generikum)	kapsler 250 mg, 500 mg	Fra 20 kg
	Dicloxacillin kapsler kan åbnes og indholdet opslættes i vand.		
Ved penicillinallergi eller børn under 20 kg: Makrolid	Clarithromycin (Klacid)	oral suspension 25 mg/ml, 50 mg/ml	Fra 6 mdr.
	Clarithromycin (billigste generikum) Roxithromycin (billigste generikum)	tabletter 250 mg, 500 mg tabletter 150 mg, 300 mg	Fra 12 år Fra 40 kg
ASTMA – 5 år eller under			
Korttidsvirkende beta 2-agonist (SABA)	Salbutamol Salbutamol	inhalationsspray, 0,1 mg/dosis inhalationsspray, 0,1 mg/dosis	Fra 18 mdr.: Aromir Fra 4 år: Ventoline
Inhalationssteroid (ICS)	Fluticason, lav-dosis (Flixotide)	inhalationsspray, 50 µg/dosis inhalationsspray, 125 µg/dosis	Fra 1 år
Ved spray anvendes altid spacer.			
ASTMA – Fra 6 år			
Korttidsvirkende beta 2-agonist (SABA)	Salbutamol (Buventol Easyhaler)	inhalationspulver, 100 µg/dosis inhalationspulver, 200 µg/dosis	Fra 6 år
Inhalationssteroid (ICS)	Budesonid (Giona Easyhaler)	inhalationspulver, 100 µg/dosis inhalationspulver, 200 µg/dosis	Fra 6 år
Langtidsvirkende beta-2-agonist + inhalationssteroid (LABA+ICS)	Budesonid + formoterol (Bufomix Easyhaler)	inhalationspulver, 4,5+80 µg/dosis inhalationspulver, 4,5+160 µg/dosis	Fra 6 år Fra 12 år
Børn over 12 år behandles som voksne, hvormed der henvises til Basislisten om astma for voksne.			
ASTMA – Fra 6 år, hvis inhalationspulver ikke kan anvendes			
Inhalationssteroid (ICS)	Fluticason (Flixotide)	inhalationsspray, 50 µg/dosis inhalationsspray, 125 µg/dosis	Fra 6 år
Langtidsvirkende beta-2-agonist + inhalationssteroid (LABA+ICS)	Formoterol+fluticason (Flutiform spray)	inhalationsspray, 5+50 µg/dosis inhalationsspray, 5+125 µg/dosis	Fra 6 år Fra 12 år
Ved spray anvendes altid spacer.			
GASTROØSOFAGEAL REFLUKS			
Protonpump hæmmer	Esomeprazol ⁶ (billigste generikum) Omeprazol (billigste generikum)	enterogranulat til oral suspension i brev 10 mg enterokapsel, 10, 20, 40 mg	Fra 1 år Fra 6 år / 20 kg
Behandling med Gaviscon oral suspension kan afprøves. Vær opmærksom på, at Gaviscon oral suspension indeholder propylparahydroxybenzoat (E216) og methylparahydroxybenzoat (E218), der kan give en allergisk reaktion. Omeprazol enterokapsler skal synkes hele, om må ikke tygges eller knuses. Omeprazol enterokapsler kan evt. åbnes og opslættes i vand uden kulsyre eller i frugtjuice. Esomeprazol enterogranulat til oral suspension skal opslættes i vand uden kulsyre. Opslætningen skal indtages med det samme eller inden for 30 minutter. Behandling med PPI forbedrer ikke spædbørns antal afbrudte madindtag grundet gylp eller gråd, men øger risikoen for bivirkninger såsom luftvejsinfektioner. Behandling af spædbørn med PPI skal foregå på specialistniveau, og initieres af børnelæge.			
SMERTER			
Svage analgetika	Paracetamol: Billigste generikum Panodil Junior (GSK Consumer Healthcare) ^{7,8} Billigste generikum	tabletter 500 mg oral suspension 24 mg/ml suppositorier 125, 250 mg	Fra 6 år
NSAID	Ibuprofen: Billigste generikum	tabletter 200 mg	Fra 6 år / 20 kg
Børn over 12 år behandles som voksne, hvormed der henvises til Basislisten om smerter for voksne.			

* Aldersgodkendelse jævnfør produktresumé.

⁶ Både Nexium® og Esomeprazol "Orifarm" enterogranulat til oral suspension indeholder polysorbit 80, som hos neonatale har medført alvorlig (fatal) hepatotoxicitet ved doser > 80 mg/kg/dag.

⁷ Indeholder methyl- og propylparahydroxybenzoat, som kan give en (typisk forsinket) allergisk reaktion.

⁸ Pinex® Junior oral opløsning (ikke-rekommanderet) anbefales ikke, da det indeholder benzylalkohol.

Læs mere om forsigtighedshensyn ved indhold af potentielt skadelige tilsætningsstoffer i lægemidler til børn og unge på Medicinfunktionen.dk under 'Om Børnebasislisten'.