

Insuliner – kun præparer i pen er inkluderet

Type	Lægemiddelstof	Handelsnavn og tilskud	Prisniveau pr. DDD [▽] (1 DDD = 40 IE)	Virkning			Kommentar
				Virkning indtræder efter ca.	Maksimal virkning efter ca. timer	Virknings- varighed (timer)	
Hurtigtvirkende	Insulin aspart	● Insulin aspart 'Sanofi'	6 kr.	15 min.	½ – 3	2 – 5	Biosimilære med samme effekt. Ikke substituerbare – ordinér billigste præparat.
		● NovoRapid	7 kr.				
		⊗ Fiasp	13 kr.	10 min.	½ – ⅔	3 – 5	
	Insulin glulisin	Apidra	10 kr.	15 min.	½ – 3	2 – 5	
	Insulin lispro	Humalog	12 kr.	15 min.	½ – 3	2 – 5	
Intermediærtvirkende	Insulin (human)	⊗ Insulatard	10 kr.	1½ time	4 – 12	24	
		⊗ Humulin NPH	10 kr.	1½ – 2 timer	4 – 8	18 – 36	
Langtidsvirkende	Insulin glargin	● Semglee	7 kr. (32 IE)	4 timer	6 – 12	24	Biosimilære med samme effekt. Ikke substituerbare – ordinér billigste præparat.
		● Lantus	8 kr. (32 IE)				
		Abasaglar Kwikpen	10 kr. (32 IE)				
		⊗ Toujeo	10 kr.	4 timer	6 – 12	Op til 36	
	Insulin detemir	⊗ Levemir	11 kr.	3 – 4 timer	6 – 12	24	
	Insulin degludec	⊗ Tresiba	10 kr. (32 IE)	15 min.	Jævn fordelt over 24 timer	>42	Findes i 100 IE/ml (doser på 1-80 IE) og 200 IE/ml (doser på 2-160 IE). Dosistællerne på pennen viser den valgte dosis i IE. Ved skift af styrke skal dosis ikke ændres.
Blandingsinsulin	Insulin aspart	● NovoMix 30 og 50	10 – 14 kr.	15 min.	1 – 4	24	Hurtigt- og intermediærtvirkende insulin.
	Insulin lispro	Humalog Mix25	12 kr.	15 min.	1	18 – 36	
	Insulin aspart og insulin degludec	Ryzodeg	24 kr.	15 min.	Jævn fordelt over 24 timer	>42	Hurtigt- og langtidsvirkende insulin.
Kombination	Insulin degludec, liraglutid	⊗ Xultophy	46 kr.	15 min.	Jævn fordelt over 24 timer	>42	Langtidsvirkende insulin og GLP-1-RA.

● = Generelt tilskud

⊗ = Klausuleret tilskud

Intet symbol = intet tilskud

▽ = Pris pr. 09.09.24 jf. medicinpriser.dk ud fra 40 IE med mindre andet angivet på baggrund af sammenligningsdoserne fra Medicinrådets behandlingsvejledning.

Kilder: Pro.medicin.dk, medicinpriser.dk

Antidiabetika ekskl. insulin

Lægemiddelgrupper er sorteret efter pris

Lægemiddel (Anbefalet af Medicinrådet)	Handelsnavn og tilskud	Prisniveau pr. døgn [▼]	Effekt på				Kommentar				
			HbA1c	CVD og/eller nyresygdom	Hjertesvigt	Vægt					
Biguanider											
Metformin	● Metformin ● Mitforgen	1 kr.	↓↓↓	Mulig forebyggende effekt på CVD	–	Fald	<ul style="list-style-type: none"> Gradvis dosisoptitrering (ugtl.) for at mindske GI-bivirkninger. Dosis ↓ ved eGFR 30-45 ml/min. Seponer ved eGFR <30 ml/min. 				
Sulfonylurinstoffer											
Gliclazid	● Gliclazid ● Diamicron Uno	1 kr.	↓↓↓	Neutral	Neutral	Stigning	<ul style="list-style-type: none"> Gradvis langsom dosisoptitrering for at undgå hypoglykæmi. Dosis ↓ ved eGFR 30-60 ml/min. Seponer ved eGFR <30 ml/min. Risiko for hypoglykæmi især hos ældre. Undgå kombination med insulin. 				
Glimepirid	● Glimepirid ● Glimonor	2 kr.									
DPP-4-hæmmere											
Sitagliptin	● Sitagliptin, ● Januvia ● Xelevia	<1 kr.	↓↓	Neutral	Neutral	Neutral	<ul style="list-style-type: none"> Dosis ↓ ved eGFR <45-50 ml/min. (frasret linagliptin). Ved hjertesvigt og behov for DPP-4-hæmmere foretrækkes sitagliptin. Undgå kombination med GLP-1-RA. 				
Alogliptin	Vipidia	10 kr.									
Saxagliptin	Onglyza	10 kr.									
Linagliptin	Trajenta	14 kr.									
SGLT-2-hæmmere – foretrukket valg hos patienter med diabetes og hjertesvigt, CVD og/eller nyresygdom											
Canagliflozin	● Invokana	13 – 15 kr.	↓↓↓	Forebygger #	Forebygger #	Fald*	<ul style="list-style-type: none"> Dosis ↓ for canagliflozin og empagliflozin ved eGFR <60 ml/min. Læs mere på 'Lægemidler ved nedsat nyrefunktion' Effekt på HbA1c falder ved eGFR <45 ml/min., dog stadig organbeskyttende effekt. Muligt fald i eGFR ved opstart. 				
Empagliflozin	● Jardiance	14 – 16 kr.									
Dapagliflozin	● Forxiga	16 kr.									
GLP-1-recepter agonister (GLP-1-RA)											
Inj. semaglutid 1 x ugtl.	⊗ Ozempic	31 kr.	↓↓↓↓	Forebygger #	Neutral	Fald*	<ul style="list-style-type: none"> Gradvis dosisoptitrering (mdl.) for at mindske GI-bivirkninger. Ingens dosisoptitrering ved dulaglutid. Seponer i tilfælde af uacceptable GI-bivirkninger eller uhensigtsmæssigt vægttab. For dulaglutid har kun 1,5 mg klausuleret tilskud. Undgå kombination med DPP-4-hæmmere. 				
Tabl. semaglutid 1 x dgl.	⊗ Rybelsus	31 kr.									
Inj. dulaglutid 1 x ugtl.	⊗ 1,5 mg Trulicity	37 kr.									
Inj. liraglutid 1 x dgl.	Victoza	47 kr.									
Kombinationsmidler (Prisniveau pr. døgn)[▼]											
DPP-4-hæmmer + metformin:	SGLT-2-hæmmer + metformin:		SGLT-2-hæmmer + DPP-4-hæmmer:								
● Janumet, Sitagliptin/metformin (1 kr.) Vipdomet (alogliptin+metformin) (11 kr.) Jentadueto (linagliptin+metformin) (14 kr.)	● Synjardy (empagliflozin+metformin) (13 kr.) ● Xigduo (dapagliflozin+metformin) (13 kr.) Vokanamet (canagliflozin+metformin) (18 kr.)		Glyxambi (empagliflozin+linagliptin) (26 kr.) Qtern (dapagliflozin+saxagliptin) (26 kr.)								

Nye tilskud gældende fra d. 25. november 2024.

● = Generelt tilskud

⊗ = Klausuleret tilskud

= Ved kendt CVD, nyresygdom, hjertesvigt

▼ = Pris pr. 09.09.24 jf. medicinpriser.dk på baggrund af sammenligningsdoserne fra Medicinrådets behandlingsvejledning.

* I gennemsnit ca. 1 kg forskel mellem SGLT-2-hæmmere og GLP-1-recepter agonister ved antidiabetiske doser.
Der er stor variation i vægtresponsen.

Kilder: Medicinrådets behandlingsvejledning og lægemiddelrekommendation om Type 2-diabetes, Pro.medicin.dk, DES/DSAM Farmakologisk behandling af type 2-diabetes (2022), Den National Rekommandationsliste (NRL) Farmakologisk glukosænkende behandling af type 2-diabetes vers. 2.0