

Til lægerne i almen praksis i AUH's, RRA's og RSI's optageområde  
(praksiskoordinator Lene Frisk (AUH), Thomas Clausen (RRA) og Poul Olf Olesen (RSI)).

Vedr: Ændring i referenceinterval

Analysenavn EPJ: P-Rheumafaktor(IgM)

NPU: NPU21730

**Undersøgelsens princip (uændret):** EliA med aggregeret kanin IgG som antigen. Analysen er kalibreret efter internationalt referenceserum, og koncentration angives i kIU/L.

**Nyt referenceinterval per 1.3.2019:** ≤ 5 kIU/L

Referenceinterval ændres fra at være en klinisk vejledende aktionsgrænse (< 20 kIU/L) til en reel grænse for, hvornår rheumafaktor-IgM påvises. Værdier mellem 5 og 20 er positive, men har lav specifitet og lav positiv prædiktiv værdi for rheumatoid arthritis, og de bør kun tillægges værdi ved relevant klinik.

Mistænk perifer inflammatorisk ledsgdom hvis:

- Ny ledhævelse, der ikke forklares ved anden kendt sygdom eller traume
- Ny ledsmerte, ømhed og stivhed uden hævelse

Ved mistanke bør tillige analyse for anti-CCP overvejes, da denne har betydeligt højere specifitet for rheumatoid arthritis.

Samtidig tilstedsvarelse af positive autoantistoffer (rheumafaktor eller anti-CCP) skærper mistanken, men negative autoantistoffer udelukker ikke inflammatorisk ledsgdom. For alle patienter med inflammatorisk perifer ledsgdom tilstræbes behandling iværksat indenfor de første 3 måneder af sygdomsforløbet.



Ref: TRIKOR

Dato: 23.1.2019

Side 1/1

### OBS Manglende synliggørelse af ændrede referenceintervaller i EPJ

EPJ mangler funktionaliteter, der muliggør synliggørelse af ændringer i analysemетодer og referenceintervaller.

Resultater udført på den nye platform og med nyt ref.interval (< 5 kIU/L), vil i EPJs rekvisition-svar modul derfor komme til at stå på samme sted/i samme række, som evt. tidligere resultater svaret med det 'gamle' referenceinterval (< 20 kIU/L). Dét på analysetidspunktet gældende referenceinterval vil dog stadig kunne ses ved mouse-over på det pågældende resultat, og tidligere resultater vil heller ikke skifte farve, hvis de falder uden for det nye ref. interval.

**Bemærk:** Ovenstående ændring gælder udelukkende analyse for P-Rheumafaktor(IgM) udført på Blodbank og Immunologi, AUH.

Analyse for P-Rheumafaktor(IgM) udføres tillige i HEV, HEM og HEH, hvor referencetintervaller er uændrede.

Evt. spørgsmål kan rettes til Trine Korsholm (78455007 eller trinkors@rm.dk)

Venlig hilsen

Trine Korsholm  
Afdelingslæge  
Blodbank og Immunologi

Ellen-Margrethe Hauge  
Ledende overlæge  
Reumatologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital

