

Indhold

- Basislisten for antibiotika er opdateret
- Ciprofloxacin og risiko for hjerteinsufficiens
- Seponeringslisten er opdateret
- Nordjydernes opioidforbrug er (fortsat) faldende
- Vi piller ved pillerne – medicinsamtale ved farmaceut i almen praksis
- Nyhedsbrev fra Klinisk Farmakologisk Afdeling



ANTIBIOTIKA: BASISLISTEN OG LÆGEMIDDELENHEDENS KLINISKE BUDSKABER ER OPDATERET

Se dem her:

- [Infektioner](#)
- [Kliniske budskaber](#)

Faldende forbrug af fucidin

Forbruget af fucidin creme/øjendråber er faldende i Region Nordjylland, men forbruget kan reduceres yderligere. Klinisk Mikrobiologisk afdeling fraråder brug af fucidin pga. resistensudvikling.

Antibiotikaproylakse ved sår

Husk antibiotikaproylakse ved bidsår og forurenede sår, der gennembrøder huden.

[Læs mere i de kliniske budskaber om antibiotika](#)

CIPROFLOXACIN OG RISIKO FOR HJERTEKLAPINSUFFICIENS

Systemiske fluorquinoloner kan øge risikoen for hjerteklapinsufficiens. Et nyligt epidemiologisk studie rapporterede en fordobling af risikoen for mitralklap- og aortaklapinsufficiens blandt patienter, der tager systemiske fluorquinoloner sammenlignet med patienter, som anvender anden antibiotika (amoxicillin, azithromycin). Foretag derfor en grundig vurdering af fordele/risici-forholdet samt risikoen for hjerteinsufficiens hos den enkelte patient, inden opstart af behandling.

[Læs mere her](#)


SEPONERINGSLISTEN ER OPDATERET

Lægemeddelenheden har deltaget i den årlige opdatering af Seponeringslisten.

[Se den nye 2021-udgave her.](#)


NORDJYDERNES OPIOIDFORBRUG ER (FORTSAT) FALDENDE

Antal personer i behandling med opioider falder i alle regioner. I Region Nordjylland (RN) er antal personer faldet med 26 % fra 2016 til 2020 - for hele landet ses et gennemsnitligt fald på 27 %.




Det sker efter flere års indsats på både regionalt og nationalt plan. Senest har Lægemiddelstyrelsen i 2018 ændret udleveringsbestemmelserne for tramadol og andre opioider, så disse lægemidler er underlagt samme skærpede overvågning som fx morfin.

Ser man på mængdeforbruget (DDD) i RN, er det særligt tramadol, men også codein (inkl. komb. præparater), der falder.



Antal personer i behandling med opioid-plastre (fentanyl og buprenorfin) er i samme periode faldet med 21 % i RN (lignende fald ses på landsplan) - se figur på næste side. Ca. 8 % af alle personer, i behandling med opioider, bruger plastre. Denne andel har ligget ret stabilt siden 2018 og er lidt lavere end landsgennemsnittet.

Brug af medicinske plastre er forbundet med utilsigtede hændelser, så plastre bør kun anvendes, hvis oral indtagelse ikke er muligt. Vær desuden opmærksom på, at opioidplastre har misbrugspotentiale fx hvor indholdet ryges.



Tidligere så man i perioden 2001-2013 en fordobling i opioidforbruget i Danmark, ligesom Danmark har ligget markant højere end nabolandene Norge og Sverige, når det gælder forbrug af tramadol. Om den faldende tendens skyldes øget mediefokus på bivirkninger og afhængighed, Sundhedsstyrelsens og Lægemiddelstyrelsens tiltag eller LMEs utrættelige indsats på området er vanskeligt at afgøre, men der er under alle omstændigheder tale om en positiv tendens.

VI PILLER VED PILLERNE – MEDICINSAMTALE VED FARMACEUT I ALMEN PRAKSIS: NY RAPPORT FRA NORD-KAP

Kvalitetsprojekt om lægemiddelbehandling af polyfarmacipatienter. En tværfaglig indsats mellem læge, sygeplejerske, farmaceut og patient.

104 polyfarmacipatienter har haft en medicinsamtale med farmaceut

Lægemiddelenhedens to farmaceuter har gennemført medicingennemgang i almen praksis på 232 polyfarmacipatienter i en periode på 6 måneder. Interventionsforslagene blev drøftet med en læge, der herefter uddelegerede behandlingsplanen til farmaceuten. Patienterne blev herefter tilbudt og indkaldt til en medicinsamtale (104), eller der blev udarbejdet et journalnotat med interventionsforslag (92) til senere opfølgning. Farmaceuten fulgte op på medicinsamtalerne pr. telefon, fx i forbindelse med aftrappingsforløb.

664 interventionsforslag hos 232 patienter

Hos 196 patienter (85 %) blev der fundet 664 interventionsforslag. Det svarer til 3,4 pr. patient. Der blev gennemført 464 medicinændringer (70 %), hvoraf 122 lægemidler blev seponeret og 88 lægemidler blev dosisjusteret, heraf flest reduceret.

[Du kan læse den spændende rapport her.](#)

NYHEDSBREV FRA KLINISK FARMAKOLOGISK AFDELING

I [dette nyhedsbrev](#) kan du bl.a. læse om længerevarende behandling med metoclopramid og udvikling af tardiv akatysi, samt om Bonyl mikstur må anvendes til små børn.

Nyhedsbrevet udarbejdes af Lægemiddelenheden

Læs mere om Lægemiddelenheden på www.nordkap.dk

For mere information skriv til lme@rn.dk