

Vejledning til revurdering af GLP-1 analog


Sundhedsstyrelsen og DSAM opfordrer til, at indikation for GLP-1 agonister vurderes med omhu både ved nyopstart og ved de løbende kontakter. Det kan fx være ved receptfornyelser, ved mellem- og årsstatus for diabetes eller ved restordreproblemer.

Overvejelser ved revurdering af behandling med GLP-1 analog

- Hvad var indikationen for opstart af behandlingen?
- Har patienten prøvet de anbefalede antidiabetika med generelt tilskud?
- Spørg ind til oplevelse af bivirkninger og livskvalitet på behandlingen.

Overvej behandlingsskift til antidiabetika med generelt tilskud, afhængigt af patientens komorbiditet, øvrige risikofaktorer og effekt af tidligere afprøvet behandling, jf. de nationale retningslinjer og tilskudsregler (bilag 1).

Figur 1 nedenfor giver vejledning til revurdering af GLP-1 analog hos særlige patientgrupper.



Figur 1. Vejledning til revurdering af GLP-1 analog hos særlige patientgrupper.

Kilder:

- [Medicinrådets lægemiddelrekommandation vedrørende antidiabetika til type 2-diabetes, version 1.3, april 2023.](#)
- [Medicintådets behandlingsvejledning vedrørende antidiabetika til type 2-diabetes, version 1.1, marts 2023](#)
- [Farmakologisk behandling af type 2 diabetes. Fælles retningslinje fra DES og DSAM \(2022\).](#)
- [National behandlingsvejledning for type 2 diabetes \(2022\).](#) Dansk Endokrinologisk selskab.
- [Fælles regional antidiabetikaoversigt, version 1.0, august 2023.](#)
- [Pro.medicin.dk / The European Medicines Agency.](#) Produktresumé.