

# Kighostevaccine til gravide

## Hændelser

En kvinde, som er gravid i uge 38, kontakter egen læge, da hun er blevet opmærksom på, at gravide opfordres til at få kighostevaccination. Hun er ikke informeret om eller tilbudt dette i forbindelse med 3. graviditetsundersøgelse. Hun tilbydes kighostevaccination dagen efter, men med besked om at vaccinen ikke nødvendigvis vil have effekt, hvis hun føder inden for den næste uge.

Patienten er efterfølgende utilfreds med, at hun ikke har fået tilbudt vaccinen tidligere i graviditeten.

## Analyse

Børn under ½ år vil ofte få behov for indlæggelse, hvis de får kighoste men alvorlige komplikationer og dødsfald er heldigvis sjældne.

På baggrund af kighosteepidemien 2019/2020, blev der i efteråret 2019 indført et midlertidigt tilbud om gratis vaccination mod kighoste til gravide i 3. trimester. Dette tilbud er blevet forlænget i flere omgange og gælder aktuelt til 1. april 2021.

Kighostevaccination i 3. trimester medfører god beskyttelse af barnet mod kighoste i månederne efter fødslen. Det anbefales, at gravide vaccineres mod kighoste i forbindelse med den 3. graviditetsundersøgelse. Hvis vaccinen er givet mindre end en uge inden fødslen, forventer man ikke, at den kan nå at have effekt for det nyfødte barn.

## Forslag til forebyggende procedure

- Skærpet opmærksomhed på aktuelle tilbud om kighostevaccine til gravide
- Det anbefales at lave fraser til alle standard konsultationer herunder graviditetsundersøgelserne. I sådan en frase bør information om kighostevaccination indgå.

Litteratur/Yderligere information:

[Læs mere på ssi.dk her](#)

Lau Bertholdt  
Patientsikkerhedskonsulent i KAP-H