

Dobbelt ordination ved kombinations præparater

Hændelse

83-årig kvinde med tiltagende artrose smerter i knæ og hofter kommer til konsultation mhp smertebehandling. Hun har gennem de sidste mange år taget fast paracetamol og p.n. kodein med god effekt men synes nu, at smerterne plager hende i det daglige trods denne behandling. Egen læge og patienten drøfter muligheder for yderligere smertestillende og ender med fast Fortamol® 2 stk 4 gange dagligt.

Da hjemmeplejen kommer for at dosere medicin 4 dage senere, viser det sig, at kvinden har taget både paracetamol og Fortamol® fast 4 gange dagligt. Hun er upåvirket.

Egen læge kontaktes, og der tages blodprøver, som er normale.

Analyse

Der er talrige UTH'er, hvor kombinations præparater tages samtidig med et præparat med et enkelt af indholdsstofferne medførende dobbelt dosis. Dette enten pga. dobbelt ordination i FMK, eller fordi patienten ikke har forstået, at kombinationspræparatet erstatter enkeltstof præparatet.

Forslag til forebyggende procedure

- Særlig opmærksomhed på at seponere enkeltstof præparatet ved ordination af kombinations præparat.
- Særlig opmærksomhed på compliance ved brug af kombinations præparater.
- Det bemærkes, at Kodein generelt ikke anbefales til artrosesmerter bl.a. fordi 10 % af befolkningen ikke er i stand til at omsætte Kodein til Morfin, hvorved de i bedste fald har meget ringe effekt af Kodein.

Lau Bertholdt

Patientsikkerhedskonsulent i KAP-H