

Podning for klamydia og gonoré

Hændelse

24-årig kvinde kontakter egen læge med underlivsgener i form af ændret udflåd og svie ved vandladning. Hendes ekskæreste er behandlet for klamydia en uge forinden. Hun podes for chlamydia/gonoré, men ved en fejl anvendes en E-swab. Fejlen opdages i forbindelse med prøvesvar, og patienten kommer til fornyet GU og podning. Podningen kommer tilbage positiv for gonoré, men aflæses fejlagtigt som positiv for chlamydia. Patienten opstartes derfor i doxycyklin. Grundet fortsatte symptomer kommer patienten for 3. gang til GU, hvor der podes fra cerviks og urethra. Disse er positive for gonoré og ved svarafgivelsen opdages det, at patienten var positiv for gonoré og ikke chlamydia ved sidste cervixpodning. Patienten henvises relevant til venerologisk klinik med henblik på behandling.

Analyse

Der har over de sidste år været en kraftig stigning i både klamydia og gonoré. Sygdommene forekommer på tværs af alder, køn, seksualitet og samfundslag, men er mest udbredt hos unge med flere seksualpartnere.

Sygdommene diagnosticeres ved first void urin, selvpodning fra vagina og ved podning fra cerviks, urethra, anus (ved analsex) og tonsiller (ved oralsex).

Der bruges samme podepind (Aptima) til at undersøge for begge sygdomme. Svarene kommer dog ofte forskudt af hinanden.

Forslag til forebyggende procedurer

- Opmærksomhed på at bruge det rigtige medie ved mikrobiologiske undersøgelser. E-swab anvendes til de fleste prøver, men ikke til alle. Af den lyserøde webreq rekvisitionsseddel med strekkoden til prøven, fremgår det hvilket medie, der skal bruges til den enkelte undersøgelse,.
- Husk sikker patientidentifikation ved prøvetagninger.
- Selvpodning fra vagina kan anvendes hos symptomfri patienter, som har mistanke om smitte. Hvis kvinden har symptomer, anbefales der podning fra cerviks og urethra evt. suppleret med tonsil- og rectumpodning.
- Ved undersøgelse for seksuelt overførte sygdomme er det vigtigt at sikre sig man har korrekte kontakt oplysninger mhp. svarafgivelse. Mange teenagere har deres forældres kontaktoplysninger registreret i stamkortet.
- Vær opmærksom på partneropsporing i forbindelse med seksuelt overførte sygdomme.
- Gonore er anmeldelsespligtig og skal anmeldes på Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2)

Litteratur/yderligere information:

- [Anmeldelsespligtige sygdomme](#)

Lau Bertholdt

Patientsikkerhedskonsulent i KAP-H

lauberholdtkaph@gmail.com