

## **Tjek inden du vaccinerer!**

Et barn kommer til 1 års børneundersøgelse hos uddannelseslægen, og vaccineres med DiTeKigPol/ACT-Hib og pneumokok vaccinen. Vaccinen noteres i vaccinationskortet/DDV. Ved supervision opdages det, at barnet de andre gange er vaccineret med Hexyon. Forældre kontaktes, og barnet tilbydes supplerende vaccination mod hepatitis B.

### Analyse

Der er 2 problemstillinger i denne case:

1: Det danske vaccinationsprogram har i mange år været stabil, og de fleste har været sikker på hvilke vacciner, der skulle gives, når patienterne kom til vaccination. Mange har derfor ikke haft behov for at tjekke vaccinationsstatus før indgiften. Man har ofte gjort dette ved MFR vaccinationen, da 15 måneders vaccinationen ikke laves ved en børne undersøgelse, og efter vaccinationsalderen blev ændret fra 12 til 4 år. Da der har været leveringsproblemer for DiTeKigPol/Act-HIB har vi nu haft en periode med parallelle vaccinationsforløb. Det må derfor anbefales, at man sikrer sig den korrekte vaccine gives. Dette gøres lettest ved opslag i DDV/vaccinationskortet, inden barnet vaccineres.

2: I analysen kom det frem, at uddannelseslægen var introduceret til børneundersøgelser og vaccinationerne, men ikke vidste at der var et midlertidigt vaccinationsprogram. Den anden problemstilling er således, hvordan vi sikrer, at vores uddannelseslæger introduceres til alle relevante emner for arbejdet i vores praksis. Der er mange oplysninger, der skal gives videre, og det er let at glemme noget. Det er også svært for uddannelseslægen at skulle rumme mange informationer. Det kan derfor anbefales, man udarbejder en tjekliste med alle de emner og områder uddannelseslægen skal introduceres til. Og at listen med passende intervaller gennemgås ved supervisionen, indtil man har været alle punkter igennem. Husk at opdatere listen, når der sker ændringer.

Ynse de Boer

Patientsikkerhedskonsulent i KAP-H