

Vaccinationer

Hændelse

7 måneder gammel dreng møder til forsinket 5 måneders børneundersøgelse incl. vaccinationer. Konsultationsrummet er uroligt, da mor har flere spørgsmål til vaccinerne, og patienten er grædende. Ved en fejl tages Fluzone High-Dose i stedet for Prevenar 13 fra køleskab, hvor vaccinerne ligger side om siden. Vaccinerne administreres som vanligt og først i forbindelse med registrering i DDV opdages fejlen. Vagthavende pædiater kontaktes, og der findes ikke anledning til bekymring eller særlig observation.

Analyse

Igennem de sidste år er vi i praksis blevet bedt om at administrere flere forskellige vacciner end vi har været vant til. Dette giver øget risiko for utilsigtede hændelser og antallet af indberettede UTH'er omkring administration af vacciner er steget.

Forslag til forebyggende procedure

For at forebygge UTH'er i forbindelse med vaccinationer foreslås det at følge disse 6 trin.

- **Identifikation** af patienten og hvilken vaccine der skal administreres. Sikre interval til andre vacciner er korrekt. Opmærksomhed på om der er kontraindikationer for vaccinen.
- **Forberedelse.** Sikre at det er korrekt vaccine som er fremme. Opblanding, optrækning og fjernelse af luft fra kanylen
- **Administration** af vaccinen
- **Information** om bivirkninger og at vente 15 min i venteværelset evt. udlevering af standard skrivelse.
- **Registrering** i DDV og journalisering af bl.a. hvor vaccinen er administreret. Ved flere samtidige vacciner er det vigtigt at registrere, hvilken vaccine der er givet hvor.
- **Ydelses** registrering

Lau Bertholdt

Patientsikkerhedskonsulent i KAP-H