

# Børnedoseringer ved flydende lægemidler til oralt brug

Doseringerne er i ml per døgn

	Styrke	Døgndosis	ml per døgn											Fordeles på antal doser	
			5 kg	6 kg	7 kg	8 kg	10 kg	12 kg	15 kg	18 kg	20 kg	25 kg	30 kg		
<b>Penicillin V</b>															
Vepicombin Novum®	85.000 IE/ml	85.000 IE/kg	5	6	7	8	10	12	15	18	20	25	30	3	
Primcillin®	50 mg/ml	50 mg/kg	5	6	7	8	10	12	15	18	20	25	30		
<b>Amoxicillin</b>															
Imacillin <sup>1</sup>	50 mg/ml	50 mg/kg <sup>3</sup>	5	6	7	8	10	12	15	18	20	25	30	3	
<b>Amoxicillin m. clavulansyre<sup>1</sup></b>															
Augmentin Forte	50/12,5 mg/ml	50/12,5 mg/kg	5	6	7	8	10	12	15	18	20	25	30	3	
<b>Clarithromycin<sup>2</sup></b>															
Klacid®	25 mg/ml	15 mg/kg	3	4	4,5	5	6	7,5	-	-	-	-	-	2	
Klacid®	50 mg/ml	15 mg/kg	-	-	-	-	3	3,5	4,5	5,5	6	8	9		
<b>Trimethoprim</b>															
Trimopan®	10 mg/ml	6 mg/kg	3	4	4,5	5	6	7,5	9	11	12	15	18	2	

<sup>1</sup> Børn > 1 måned og < 40 kg.

<sup>2</sup> Ved dosering af clarithromycin til 10 kg og 12 kg anvendes enten Klacid® (clarithromycin) 25 mg/ml eller 50 mg/ml.

<sup>3</sup> Dog højst 3.000 mg pr. døgn.